

Il chavriel – in tschierv pitschen e fin

■ Il chavriel n'è betg be il represchentant il pli pitschen entaifer la famiglia dals tschiervs, mabain la pli pitschna spezia indigena d'animals ad unglia insuma. Cun ses 18 fin 25 kg paisa el almain 5 giadas pli pauc ch'in tschierv. Era tar ils chavriels han be ils bucs ina corona. A la famiglia dals tschiervs (Cervidae) appartegnan sper il chavriel ed il tschierv er il dam, il ren e l'elan, per numnar be las spezias las pli derasadas en l'Europa. Per differenziar il chavriel indigen (Capreolus capreolus) dal chavriel siberic al numn'ins per part er chavriel europeic. En l'Europa Centrala viven dentant be dus cervids: il tschierv ed il chavriel. Tar nus furma il chavriel la spezia da tschiervs la pli derasada.

Tratgs characteristics

Chavriels creschids cuntanschan ina lunghezza da 90 fin 140 cm ed in'autezza da la spatala da 55 fin 85 cm. Il pais dals chavriels prenda tiers entaifer il territori da derasazion da las regiuns chaudas en direcziun da las regiuns fraidas. En il sidvest da la Spagna paisan ils chavriels en media 17,1 kg, en il nord dal pajais gia 23,2 kg; ed en Norvegia cuntanschan els en media in pais da 28,8 kg. Tranter ils mastegls e las femellas na datati betg differenzias significativas areguard la grondezza ed il pais.

Il pail è la stad da color brin co-tschnenta. Cun la midada dal pail durant ils mais settember/october sur-

veng quel ina color grischenta. Tant la stad sco l'enviern è la vart sut dal corp pli clera che la vart sura. Luschenumna spievel anal sa differenziescha da l'ulteriur pail ed è per regla da color alva u melnenta. Ina caratteristica che cumpara be tar ils bucs-chavriel èn flatgs alvs vi dal mintun e da mintga vart dal lef sura, per part er sur il nas.

Ils ansiels-chavriel èn da color brin co-tschna ed han a l'entschatta flatgs alvs sin il dies e da las varts. Quests flatgs cumenzan a vegnir sblatgs suenter in mais e svane-schan dal tuttafatg cura ch'ils ansiels han cuntanschi ina vegliadetgna da dus mais.

Nutriment

Il chavriel viva en bostgets e guauds maschadads. En il bostgam po el sa zuppar e chatta in nutriment varià. Durant il di sa zuppa el en il spessom. La maglia tschertga il chavriel surtut vers saira e cun l'alva da la damaun.

Il nutriment dal chavriel sa cumpona dad erva, brumbels e feglia. Il chavriel è in nas fin che maglia mo il meglier dal meglier: erva cun blers vitamins, brumbels e chatschs savurus da chaglias e plantas. Sche blers chavriels viven en in lieu, pon els far gronds donns vi da plantas giuvnas.

Il chavriel ha la tipica dentadura d'in erbivoro: la missella sura n'ha betg dents da morder ed era betg dents chanins. Il chavriel serra la maglia tranter la lieunga ed ils dents da morder sut e sdrappa davent ella. Il dent canin sut ha la furma d'in dent da morder. Tranter el ed ils molars è ina lucca naturala en ils dents. Cun ils molars davant ed ils molars davos manizza il chavriel l'er-va dira.

Cun ch'il chavriel paussa, remaglia el il nutriment ch'el ha maglià mo a la sperta. Il



L'ur dal guaud furma il spazi vital tradiziunal dal chavriel.

FOTO: B. JECHOW / PIXELIO

chavriel è damai in remagliader. Malgrà ch'ils chavriels tschernan las plantinas las pli savurusas, cuntegna lur vivonda be ina tscherta cumpart da substanzas nutritivs. Perquai chattan ins en territori da chavriels bleras chatlaunas.

La corna

Sumegliant als tschiervs portan er ils bucs-chavriel cornas. Quellas èn bler pli pi-tschnas che las cornas dal tschierv (15 fin 20 cm) e sa sviluppan per il solit fin a cornas dasis (3 pizs per corna). Sco il tschierv mida er il buc-chavriel mintg'onn la corna. El bitta giu quella mintgamai il november u decembre.

L'emprim creschan dus cucuns d'oss sin la cuppa da la chavazza. Quels han al cu-menzzament ina pel fina cun pail sco vali; questa pel sa numna pelatsch. Tras il pe-latsch culu sang che furnescha las substanzas constituyentes per il piz da l'oss che cre-scha spert.

Suenter radund 4 mais (per regla l'avrigl) è il svilup da la corna terminà. L'oss mora, il pelatsch setga e vegn sfruschà davent vi da bostgam e plantas. Ussa po il chavriel duvrar sia corna sco arma. In onn pli tard bitta el danovamain giu quella.

Pir suenter avair terminà lur svilup corporal po la corna cuntanscher la lunghezza maximala. Quai è per regla il cas suenter tschintg onns.

Marcar il revier e temp da chalur

En il temp da copulaziun, il fanadur ed avust, pretenda mintga buc-chavriel in revier. Quel marca el cun in'odur or d'ina glonda che sa chatta sin ses frunt. Perquai vesan ins la stad magari bucs-chavriel a sfruschar lur cornas vi da plantinas. Il buc-chavriel ha ulteriuras glondas vi da las chommas e tranter las unglas. Las odurs servan a la comunicaziun tranter ils singuls bucs.

Er chauras-chavriel en chalur derasan odurs che carmalan ils bucs. Ils chavriels èn en chalur da la fin fanadur fin l'entschatta avust. In cumpormento tipic durant quest temp è ch'il taur perseguiescha la chavrola èn rudè.

Reproduciun

Ina particularitat dals chavriels è il paus da l'embrio: il fetus cumenza a sa sviluppar pir

cun in retard da 3 fin 4 mais (il december). En l'Europa Centrala naschan ils ansiels per regla il matg e zercladur. Il temp da purtanza dura en tut radund 290 dis ni 9,5 mais.

La chavrola fa per il solit dus ansiels. La mamma zuppa ses ansiels savens en il pastg aut u en il chagliom. Ella deditgescha ina gronda part da sia vita a la tgira da ses ansiels. Ina mes'ura fin in'ura e mesa suenter la naschientscha è l'ansiel gia bun da star en pe; suenter ina fin trais uras emprova el da far ils emprims pass. Durant trais fin quatter emnas stat l'ansiel en segirezza, entant che la mamma pasclescha e retorna per la-schar tezzar. Sche l'ansiel auda ina canera u senta ina savur estra, resta el airi per terra. Pir suenter trais fin quatter emnas è ses cumpormento da fugia sviluppà avunda per mitschar da maschinias da segar u da scuder.

Dal segund fin il sisavel mais empren-dan ils ansiels lura tras il gieu il cumporment da cumbat, da chalur e da marcar il revier. La primavaira dal proxim onn van las famiglias-mamma lura dapart.

Vita sociala

Durant la stad viven ils chavriels per gronda part persuls u en pi-tschnas gruppas che consistan da la mamma cun ses pi-tschnas. L'enviern sa furman dentant trieps da trais fin quatter animals. Chavriels che viven sin il terren agrar avert pon er furmar rotschas da fin ventg individis. Questa moda da s'associer pli ferm l'enviern è in'adattaziun a la mancanza da nutriment durante ils mais fraids. Auter che tar las rotschas da tschiervs na munta questa furma da convivenza dentant betg exnum ch'il chavriels hajan contacts socials pli intensivs.

Quests trieps vegan per regla manads d'ina chaura-chavriel ch'ha almain in ansiel. En cas da disturbis decida ella davant la direcziun da la fugia. Vers la fin da l'enviern, avant la naschientscha da la nova generaziun d'ansiels, sa schlian las rotschas pusplè.

Cumporment en situaziun da privel

Il chavriel è enconuscent sco animal che s'orientescha fermamain sur l'odur. Ina gronda part da la pel mutschignusa dal nas è surtratga da betg main che 320 millions celles d'odurat. Uschia èn chavriels buns d'odurar in uman en ina distanza da 300 fin 400 meters.

Ils egls situads da la vari lubeschian al chavriel da surveyair ina gronda part da lur conturn senza stuair volver il chau. Chavriels reageschan sin moviments; objects che na sa movan betg na vesan els percunter betg fitg bain.

Cun in tun giappant sa fa il chavriel udir sch'el vegn spaventà. Questa reacciun è pli-tost d'interpretar sco segn d'excitaziun e d'agressiun, e main sco segn da tema. Cun giappar signalisescha il chavriel er als auters chavriels nua ch'el sa chatta.

Vegn in chavriel disturbà, stat el en pe e drizza vers anora ils lungs chavels alvs dal spievel anal. Tras quai daventa quel dapli che duas giadas uschè grond; chavriels che sa chattan en la vischinanza vegnan attents al privel e cumenzan medemmain a segir.



cunter la fom e la gronda fradaglia. Cun lur pi-tschnas chalzers sfundran ils chavriels profundamain en la naiv ed han uschia fadia da sa muventar.

L'enviern chatta il chavriel mo pauca vivonda ch'è ultra da quai pli greva da digerir. Ses magun s'adatta però a las circumstanças, regressond per bunamain 20%. Uschia po el tuttina vegnir empleni, quai ch'è fitg important per la digestiun.

Disturbis tras l'uman pon far grond donnas als chavriels. Els fugian en panica tras la navaglia e perdan qua tras bler'energia. Per ina minuta en fugia dovrà la selvaschina tant energia sco per in'ura al pass. Donns da plantas giuvnas, spussada e mort pon esser las consequenzas.

Inimis ed aspectativa da vita

Chavriels che viven en libertad cuntanschan be darar ina vegliadetgna che surpassa diesch u dudesch onns. En questa vegliadetgna èn ils dents (surtut ils molars) per ordinari isads talmain che l'animal n'è betg pli bun da mastegiar il nutrimenti.

Ma la vegliadetgna media d'ina populaziun da chavriels vegn anc influenzada da blers auters facturs, uschia che quella è savens fitg bassa. Be 15 procent da tut ils chavriels vegan pli vegs che traiss u quatter onns. Damai ch'els èn bundant pli pi-tschnas che auters animals ad unglia europeics (tschierv, elan, bison europeic), han ils chavriels blers inimis naturals. Vitiers vegnan tut tenor regiun influenzas climaticas, la spesezza da l'effec-tiv sco er malsognas e parasits. Tuttina furma il chavriel ina spezia ch'è derasada



L'enviern signifita per ils chavriels in cumbat permanent cunter la fom e la fradaglia.

FOTO PD

els e duas uras basegnan els per girar enturn. Latun e l'enviern dovrà els in'ura pli ditg per pavlar ed in'ura pli ditg per remagliar (damai ch'il nutriment cuntegna pli paucas valurs nutritivas che la stad). Ultra da quai ston els girar enturn trais uras per chattar avunda pavel; uschia restan durant las stagions fraids be pli paucas uras per ruassar e durmir.

Spazi vital

Oriundamain viveva il chavriel a l'ur dal guaud ed en clerags. En il decurs dal temp è el però s'adatta a habitats fitg differenti; ozendi al chatt'ins er in steppa agrara averta che na porscha quasi nagina protezioni. Ils territori da guaud èn oz savens pli pi-tschnas che pli baud e circumdads da territori d'agricultura; quai ha stigghi spazi da viver supplementar ch'il chavriel ha prendi-vastamain en l'Europa Centrala. En tscherts lieus è lur effectiv talmain auts ch'els periclitescan la regiunivazion naturala dal guaud. La creschientscha da las populaziuns da chavriels ha inizià en il 19avel tschientaner, cura che l'effectiv da tschiervs è sa sbassà pervi da la chatscha. A medem temp è tschessentada la disa da laschar pascular ils animals manidels (surtut chauras) en il guaud. Omadus facturs han reduci il squitsch da concurrenza a favur dals chavriels.

Betg tutgar

ils chavrielins!

Grazia a lur pail taclà èn ils ansiels-chavriel camuflads perfetgamen. In'ulteriura protezioni furma la mancanza d'atgna odur, la quala la mamma letga davent curt suenter la na-schientscha. Quai è er il motiv, daco ch'ins na duess mai tutgar animals giuvnas: ils ansiels pudessan surgi-gliar l'odur da l'uman e vegnir refu-sads uschia da la mamma.



Il camuflag tipic da l'ansiel.

FOTO PD

Cumbat per survivere l'enviern
Passentar l'enviern en las regiuns alpinas u subalpinas signifita in cumbat permanent

La preschentaziun:
Dossier «Chavriel».

Dapli infurmaziuns:
chatta.ch/?hiid=1293
www.chatta.ch