

Chagliom – il plaun mesaun dal guaud sut la marella (1. part)

■ Chaglias, chagliom, bostga, bostgam, bostgaglia... I dat pelvaira blers numbs per circumscriver il reginavel da las plantas ch'èn bain lainusas e creschan ad aut, ma che n'appartegnan betg a las plantas cun bist aut. Cum-bain che la gronda part da las chaglias sa preschenta a l'emprima egliada sco appartenchesas da pauc, sa zuppa qua in mund per sasez, plain variaziun e colurs, e betg il davos er ritg da coclas savuras per animals ed uman. Chattà preschenta intiginas da las chaglias indigenas las pli frequentas.

Atschisper

Tar l'atschisper sa tracti d'ina chaglia senza spinas, diromada fermamain e cun ina curuna fitg spessa, che cuntanscha autezzas tranter 1 e 4 meters. La feglia è da furma ovala e survegn l'atun ina colorazion caracteristica oranscha fin cotischen stgira.

L'avrige u matg, anc avant che la planta fa feglia, sa preschentan las flurs alvas en posiziun sidretg. Quellas veggan impollinadas d'insects. Tranter auter serva l'atschisper a diversas tgirallas sco impuranta planta da nectar.

Ils fritgs en furma da mail madiran l'atun. Quels èn da colur cotschen stgira

fin blau naira ed han in diameter da ca. 1 cm. Ils sems cuntegnids en ils fritgs èn pit-schen e dirs e veggan derasads tras animals ch'excreteschan quels puspè suenter avair maglià il fritg.

Ils fritgs han in gust farinus-dultschin e sa laschan elavurar a marmelada. Ils sems cuntegnan – sco dal reminent er ils minzs da maila – pit-schen quantitads da substanzas toxicas (glicosidas cianogenos) e na duessan perquai betg vegin mors en grondas quantitads; er il consun da fritgs malmadirs po manar a mal il magun u mal il venter.

Il territori da derasaziun da l'atschisper cumpiglia las regiuns muntagnardas da l'Europa Centrala, Europa dal Sid ed Europa da l'Ost, en pli parts da l'Asia Anteriura e da l'Africa dal Nord. En la part meridiunala da las Alps monta la spezia fin a 2000 m.

La planta crescha surt sin spundas sulegivals e sitgas, a l'ur da surfatschas da tschispet mez sitg ed en guauds clerds da ruvers e tieus. Ella ha er gugent terren gruppis e ritg da chaltschina.

Dapi il 16avel tschitainer vegn l'atschisper cultivà sco planta decorative in parcs e curtins. Savens veggan er fatg diever per quest intent da spezias americanas.

Clematis alva

La clematis alva è segnada da chatschs rampignants che davantan lainus e che pon cuntanscher in diameter da fin a 6 cm. Ella veggan perquai attribuida a las lianas. La planta crescha da bists siadora fin



Chapitscha da prers, clematis alva (sisum a dretga), chagliastretg simple (giudim a sanestra), cornal cotschen.

FOTOS PD



en in'autezza tranter 1 e 10 meters. La stabilitad da questi chatschs veggan cuntanschida tras il tessi rinforzant central; caracteristicas èn las vastas tracheas da la part lainusa. La clematis alva raiva cun agid dals monis da la feglia e dals fis che sa serran enturn il bist da la planta ospitanta. Sumegliant a la vigna resulta er tar la clematis alva da la manada ina scorsa strivlada. Tras ses pais e cun retrair a la planta ospitanta glisch po la clematis alva donnegiar quella fin ch'ella pirescha.

Las flurs alvas, en furma da penels, èn ordinadas sco umbellas faussas. Quellas derasan ina savur plitost spizzanta (da pesch), sumegliant als chagliastretg; qui pervi dals amens cuntegnids che duain carmalar mustgas e baus.

Il temp da fluriziu dura dal fanadur fin il settember. Tar la furmazion dal sem sa mantegnan ils pistils pailus e servan pli tardi sco organ da singular. La flur è però savens pir madira d'enviern e veggan pir purtada davent dals ferms vents da primavaira.

Tar la clematis alva sa tracti d'ina planta da piunier che preferescha guauds e bostgaglia da feglia preziosa en posiziuns frestgas fin umidas, surtut guauds da riva ed urs da guauds, ma er guauds da feglia e guauds da pigns. La planta vala sco indicatura da nitrogen. Ella è derasada en cunctanschan il terren.

Il territori da derasaziun natural dal cornal cotschen s'estenda sur l'Europa, l'Asia Minura e la regiun dal Caucasus fin en l'Asia Centrala. La spezia crescha en saivs vivas ed en la bostgaglia, pli darar er en guauds segnads d'ina gronda variazion da las spezias. Ella è surtut derasada en regiuns bassas, monta però er fin en autezzas da ca. 1500 meters.

Cornal cotschen

Questa spezia furma en l'Europa Centrala la chaglias d'in'autezza da 3 fin 4 meters. En l'Europa dal Sid po ella er sviluppar in bist e cuntanscher autezzas da 6 meters.

Bists pli vegls han ina scorsa squamada; la scorsa da la romma giuvna è percun-

ter d'in cotschen glischant. Quella e la feglia che sa colorescha l'atun cotschen han dà il num a la planta. Suenter dus onns nè la romma betg pli pailusa e daven-ta brin-uliva.

Ils portaflurs sa chattan a la fin da la romma. Radund 20 fin 50 flurs èn ordinadas en furma d'in umbrella paniclada da 4 fin 8 centimeters. La singula flur dispona da quatter fegls da la curuna alvs d'ina lunghezza da radund 5 millimeters. Il temp da fluriziu dura dal matg fin il zercladur. Las flurs cun lur savur da pesch attiran insects pli gronds, surtut mustgas, aveuels selvadis e baus.

Ils fritgs da cros madiran il settember, daventan blau nairs e cuntanschan in diamenter da 5 fin 8 millimeters. Sco atgnadad dal cornal cotschen ha magari lieu l'entschatta avust ina seconda fluriziu; las flurs ed ils fritgs quasi madirs cumparan alura sin la medema planta. Ils fritgs sco tals n'en bain betg da tissi, ma na pon betg vegin mangiads crivs; els cuntegnan bler vitamin c e veggan magari elavurads a sucs da fritgs e marmelada. Sur-tut servan els però sco nutriment a beras differentas spezias d'utschels, ils quals procuran alura per la derasaziun dal sem.

Per part ha lieu ina multiplicazion vegetativa nà da las ragischs u da roms che cunctanschan il terren.

Il territori da derasaziun natural dal cornal cotschen s'estenda sur l'Europa, l'Asia Minura e la regiun dal Caucasus fin en l'Asia Centrala. La spezia crescha en saivs vivas ed en la bostgaglia, pli darar er en guauds segnads d'ina gronda variazion da las spezias. Ella è surtut derasada en regiuns bassas, monta però er fin en autezzas da ca. 1500 meters.

Sorber nanin

Il sorber nanin tutga tar il gener Sorbus, al qual appartegnan tranter auter er il fignicler ed il culaischen. En l'Europa Centrala è il sorber nanin la pli pitschna spezia entaifer quest gener. La planta na sa lascha strusch scumbigliar; la feglia sumeglia quella dal fignicler, ma il sorber nanin crescha per ordinari a moda sparpagliada e na furma nagan chagliom spess.

La planta cuntanscha in'autezza da 1 fin 1,5 meters, darar fin 3 meters. Ils fegls èn ovals-lunghents e veggan 3 fin 7 centimeters lungs; la vart sura è d'in verd glischant.

Ils portaflurs sa chattan a la fin da las frastgas giuvnas. Las singulas flurs èn fitg pitschnas, ma creschan en puschels che dattan en egl cun lur fegls da la curuna da colur rosa fin cotschnenta. La planta

Centrala; daspera cumpara el er en l'Africa dal Nord, l'Asia Anteriura ed en l'Afghanistan. La planta crescha en vischinanza da saivs vivas, bostgaglia, a l'ur da guauds e sin spundas grippusa. Ella cumpara en lieus sulegivals u en la mesa sumbriva; envers il terren è ella toleranta, ma preferescha terrens ritgs da chaltschina.

Savens vegg il chagliastretg simpel er emplantà. El è adattà tant sco planta decorative sco er per furmar saivs vivas, dama ch'el sa lascha tagliar bain. Pervi da sias spinas po il chagliastretg er vegin emplantà intenziunadament a favur da la protecziun dals utschels. Sco planta decorative èn enconuscentas diversas furmas cultivadas ed ibrids, tranter auter sorts cun flurs cotschnas enstagl alvas.

La feglia, ils fritgs e las flurs veggan er elavurads ad in med curativ che duai promover la circulazion dal sang e dar sustegn en cas d'ina flavezza dal cor. Pli baud serviva la feglia dal chagliastretg magari sco surrogat da té u da tubac, ils sems mulads sco surrogat da café. Setgentads veginvan els maschadads en il pavel da las chauras, ubain veginvan er mangiads en temp da crisa. A l'effect constipant dal fritg fa allusiu il num oriund rumantsch «chajastretg»; quel è pli tard vegin nobilisà en «chagliastretg», mantegnend però il genus masculin.

Sper il chagliastretg simpel è er derasà vastamain il chagliastretg dubel. Sco ch'il num di gio, disponan las flurs da questa spezia però betg be dad in, mabain da dus u schizunt trais stigmas. Correspondentamain cuntegnan er ils fritgs dus u trais cros. Abstrahà da quai èsi grev da distinguere las duas spezias ina da l'autra. Il chagliastretg dubel è però be derasà en l'Europa.

Chapitscha da prers

Questa chaglia crescha fin 3 meters u po er avair la cumparsa d'ina planta da fin 6 meters. Ils roms giuvens èn verds ed han quatter chantuns. La feglia en posiziun opposta ha ina furma ovala u da lantschetta ed urs gulivs.

Il temp da fluriziu dura dal matg fin il zercladur. Las flurs han quatter fegls da la curuna e na dattan betg en egl. Il nectar attira però bleras spezias d'insects, surtut furniclas e mustgas.

Or da las flurs sa sviluppan fin il settember u october capsulas da fritg cot-schen purpuris cun sems oransch mel-lens da tissi. La furma da las capsulas da fritgs ha dà il num a la chapitscha da prers. La planta vegg savens infestada da rasulaunas d'ina spezia da chamaulana da tailas specifica. La chaglia è lura enzagliada en ina spessa taila, en la quala las rasulaunas maglian la feglia. En cas d'in'infestium moderada nè la planta betg periclitada e po danovamain pruir.

La planta cumpara surtut en l'Europa Centrala, me er en vastas parts da l'ulti-teriura Europa; en l'Asia plinavant fin en la part settentrionala da l'Asia Minura ed en la regiun dal Caucasus.

La chapitscha da prers crescha surtut a l'ur da guaud, en la bostgaglia e sin spundas. Ella basegna terrens ritgs da substanzas nutritivas e da chaltschina, ma cun pauc sal.

La selvicultura apprezziescha la chapitscha da prers sco protecziun cunter erosio e per sanar rivas e scarpas. Pervi da sia bella coloraziun d'atun cun las flurs cotschnas e la furma insolita, chan-tunusa da la romma paradescha la planta savens en curtins e parcs.



Las flurs (nectar) e las coclas da bleras chaglias, sco qua l'atschisper, furman per blers insects in'impuranta funtauna da nutriment.

La preschentaziun:
Dossier «Chagliom».

Dapli infurmaziuns:
chatta.ch/?hiid=4518
www.chatta.ch